

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗТОЧНИЯ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ И ПРАСКОВЕНИЯ КЛОНКОВ МОЛЕЦ

Два различни вида, които причиняват подобна повреда по летораслите и плодовете

ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

GRAPHOLITHA MOLESTA



VS

ПРАСКОВЕН КЛОНКОВ МОЛЕЦ

ANARSIA LINEATELLA



Младите ларви правят тунели във върха на летораста и причиняват увяхване и загиване на връхните няколко сантиметра.

СТЪПКА 1

Важно е да се определи кой е неприятелят за да избере правилният феромон за феромонния капан. Завяхващите леторасли се разрязват по дължина, за да се види ларвата вътре.



ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ

VS



ПРАСКОВЕН КЛОНКОВ МОЛЕЦ

СТЪПКА 2

Постави феромонен капан с полов феромон на съответния неприятел, за да проследиш началото на летеж на възрастните.



СТЪПКА 3

Приложи подходящите инсектициди, започвайки с регулатори на растежа веднага след начало на летеж.