

ЗАПАДЕН ЦВЕТОВ ТРИПС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ, КАРТИНА НА ПОВРЕДАТА И КОНТРОЛ



Един жизнен цикъл завършва за 2 до 6 седмици в зависимост от температурата. Развива до 15 поколения годишно.

1 ЯЙЦА

Бъбрековидни, прозрачни, снесени в паренхимата на листата



2 ЛАРВА

От прозрачно бяло или жълтеникаво до оранжево-жълто.



3 ВЪЗРАСТНО

Около 1 mm на дължина, жълто до светло кафяво



4 ПРЕДКАКАВИДА

Предкакавидата и какавидата може да се разпознаят по развиващите се зачатъци на крила, намират се в почвата, по листата, цветовете.



КАРТИНА НА ПОВРЕДАТА

Ларвите и възрастните смучат сок от растенията, причинявайки деформации на пъпките и плодовете, както и различни по форма петна, граскулки, сребристо или бронзово оцветяване на листата. Вектор на вирусни болести (MYSV).



КОНТРОЛ

Сини лепливи плоскости
Обеззаразяване на почвата
Използвай мрежи на входове и проветрителни за негонуване в оранжерии
Биологичен контрол – хищни акари, хищни гървеници (*Orius* spp), ентомопатогенни нематоди, ентомопатогенни гъби.