

FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS

# KVĚTOPAS ZÁPADNÍ

## ŽIVOTNÍ CYKLUS, PŘÍZNAKY POŠKOZENÍ A KONTROLA



Životní cyklus je dokončen za 2 až 6 týdnů v závislosti na teplotě. Až 15 generací za rok.

### 1 VAJÍČKO

Ledvinovitě průsvitné, nakladené do rostlinných pletiv.



### 2 LARVA

Průhledná bílá nebo nažloutlá až oranžovožlutá



### 3 DOSPĚLÍ

Asi 1 mm dlouhý, žlutý až světle hnědý



### 4 PUPA

Prepupální a pupální instary lze poznat podle vyvíjejících se křídelních pupenů v zemi, listech a květech.



### PŘÍZNAKY POŠKOZENÍ

Larvy a dospělci sají rostlinnou šťávu a způsobují deformaci pupenů a plodů a řadu skvrn na listech, jizvy, stříbřitost a bronzovatění. Přenašeč významných virových chorob (MYSV).



### KONTROLA

Modré lepkové pasty  
Sanitace  
K omezení pohybu trásněnek ve skleníku použijte zástěny.  
Biologická ochrana - draví roztoči, draví brouci (Orius), entomopatogenní hlístice a entomopatogenní houby.