

# ΚΑΦΕ ΒΡΩΜΟΥΣΑ

## ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

### ΑΥΓΑ

Ανοιχτά πράσινα ή γαλάζια, διαμέτρου 1 χλστ., τοποθετημένα σε ομάδες περίπου 20-30 αυγών.



### ΝΥΜΦΗ

Νύμφες 2ου, 3ου, 4ου και 5ου σταδίου μωζούν φυτικούς χυμούς, προτιμώντας τα αναπαραγωγικά μέρη του φυτού.



### ΕΝΗΛΙΚΟ

Ενήliko μήκους 12-17χλστ., καφέ χρώμα με στίγματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης περιλαμβάνουν λευκές λωρίδες στις κεραίες και τα πόδια και εναλλασσόμενες σκούρες και ανοιχτόχρωμες ταινίες στο περιθώριο της κοιλιάς.



Η ανάπτυξη από αυγό στο ενήliko διαρκεί περίπου 40 έως 60 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το φυτό ξενιστή.

### ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

Η *Halyomorpha halys* προκαλεί φελλώδεις περιοχές στη σάρκα των καρπών των δέντρων και ορισμένων λαχανικών, αποχρωματισμό, χλωρωτικές κηλίδες, ακόμη και νέκρωση. Κατά την ανάπτυξη φρούτων, ιδιαίτερα των ροδάκινων, μπορεί να προκληθεί χαρακτηριστική παραμόρφωση.



### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Βασίζεται στην παρακολούθηση της εμφάνισης του εντόμου με παγίδες. Εφαρμόστε καολίνη σε σπυρώνες μετά από την αλλαγή του χρώματος των καρπών. Χρησιμοποιήστε φυσικούς εχθρούς: παρασιτοειδείς σφήκες όπως *Trissolcus japonicus*, *Trissolcus basalis*, *Anastatus bifasciatus*, ή εντομοπαθογόνους μύκητες όπως η *Beauveria bassiana*. Χρησιμοποιήστε ελκυστικές παγίδες φερομόνης με εντομοκτόνα πυρεθρίνης ή περμεθρίνης (στρατηγική "προσέλκυσης και θανάτωσης").

