

ALEYRODES PROLETELLA

ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



Υπάρχουν συνήθως τέσσερις έως πέντε γενιές το χρόνο. Η ανάπτυξη μιας γενιάς ποικίλει από τρεις έως έξι εβδομάδες. Σε μέρη με κρύους χειμώνες, οι αλευρώδεις του λάχανου διαχειμάζουν ως ενήλικες σε άλλα σταυρανθή σε προστατευμένες τοποθεσίες και μεταναστεύουν σε καλλιέργειες για να γεννήσουν αυγά από τα μέσα Μαΐου και μετά.

2 ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ

Υπάρχουν τέσσερα προνυμφικά στάδια. Η προνύμφη 1ου σταδίου είναι ωοειδής, επίπεδη και διαφανής με κίτρινο περιεχόμενο του σώματος. Όταν η προνύμφη του 4ου σταδίου φτάσει στο πλήρες μέγεθος, νυμφώνει μέσα στο δέρμα της προνύμφης, το οποίο ονομάζεται δερμάτιο.



1 ΑΥΓΑ

Τα ωοειδή αυγά εναποτίθενται σε σχήμα δακτυλίου. Αρχικά ανοιχτόχρωμα, σκουραίνουν πριν εικολαφθούν.



3 ΕΝΗΛΙΚΑ

Μήκος 1,5 χλστ., με λευκά φτερά μα τέσσερις γκρι κτήλιδες. Το κέφαλο και ο θώρακας είναι σκούρα, ενώ η κατώ πλευρά είναι κιτρινή. Τα μάτια είναν κόκκινα.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Αφαίρεση ζιζανίων ξενιστών. Κάνοντας ένα διάλειμμα μέσα στο έτος από την καλλιέργεια σταυρανθών. Αφαίρεση φύλλων με μεγάλους αριθμούς νεαρών αλευρωδών και θάψιμο ή κομποστοποίηση των φύλλων. Ο ψεκασμός της κάτω πλευράς των φύλλων με σαπουνόνερο θα σκοτώσει τα ενήλικα πριν γεννήσουν αυγά σκοτώνοντας παράλληλα τις νεαρές προνύμφες. Οι ψεκασμοί εντομοκτόνων πρέπει να γίνονται στις κάτω πλευρές των φύλλων.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Συναντάται αποικίες στην κάτω πλευρά των φύλλων, που τα σπασμούν και εκκρίνουν μελίτωμα, προκαλώντας την ανάπτυξη μούχλας.

