

NEZARA VIRIDULA

NEZARA ZIELONA

CYKL ŻYCIA, OBJAWY USZKODZEŃ I ZWALCZANIE



DOROSŁY OSOBNIK

Duży pluskwiak w kształcie tarczy o matowozielonym kolorze (brązowym w niższych temperaturach), długości 13-15 mm, z 3-5 białymi kropkami z przodu przedplecza.

JAJA

Skupiska jaj są zazwyczaj składane na spodniej stronie liści i wylęgają się po około 5 dniach.

OBJAWY USZKODZEŃ

Żywi się wszystkimi częściami roślin, preferując rosnące pędy i rozwijające się owoce. Uszkodzenia owoców spowodowane żerowaniem są widoczne jako twarde brązowe lub czarne plamy, zaatakowane pędy zwykle usychają, a w skrajnych przypadkach obumierają. Wzrost młodych owoców jest opóźniony. Nimfy piątego stadium rozwojowego i osobniki dorosłe powodują największe szkody, podczas gdy młodsze stadia rozwojowe są mniej znaczące.



ZWALCZANIE

Osy pasożytnicze, takie jak *Trissolcus basalis*, *Anastatus bifasciatus*; grzyby entomopatogenne, takie jak *Beauveria bassiana*; biologiczne środki owadobójcze (neem, pyretryna); sadzenie roślin odstrasżających - czosnek, kocimiętka, lawenda, tymianek, nagietek i chryzantema.