

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ SE FACĂ DISTINCȚIA ÎNTRE MOLIA ORIENTALĂ A FRUCTELOR ȘI GĂURITUL RAMURILOR DE PIERSIC

Doi dăunători diferiți care provoacă aceleași pagube pe crengile și fructele de piersic

MOLIA ORIENTALĂ A FRUCTELOR

GRAPHOLITHA MOLESTA



VS

GĂURITUL RAMURILOR DE PIERSIC

ANARSIA LINEATELLA



Larvele tinere sapă prin tuneluri în vârfurile lăstarilor, ceea ce provoacă ofilirea și moartea la unul sau mai mulți centimetri de la vârf.

PASUL 1

Este foarte important să se identifice speciile de dăunători pentru a alege corect momeala pentru capcana cu feromoni. Lăstarii ofiliți ar trebui să fie deschiși pentru a verifica larvele din tunel.



MOLIA ORIENTALĂ A FRUCTELOR



GĂURITUL RAMURILOR DE PIERSIC

PASUL 2

plasați capcane cu feromoni pentru speciile respective de dăunători pentru a monitoriza începutul zborului adulților.



PASUL 3

Aplicați PPP-urile corespunzătoare, începând cu regulatorii de creștere a insectelor după începerea zborului.